

Els antiinflamatoris tipus aspirina o ibuprofèn i les malalties del cor, renals o del fetge




Les persones amb malalties del cor, renals o malalties del fetge no haurien de prendre de manera rutinària antiinflamatoris no esteroïdals (tipus aspirina, ibuprofèn o naproxèn)

L'Essencial és una iniciativa de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que identifica pràctiques clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d'evitar-ne la realització. Aquestes recomanacions són consensuades i avalades per les societats científiques, els professionals sanitaris, els pacients i l'AQuAS.

Aquesta fitxa és una recomanació adreçada als ciutadans per a l'ajuda a la presa de decisions en l'atenció sanitària i ha comptat amb la col·laboració de la CAMFiC-Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i el suport de la Societat Catalana de Cardiologia i la Societat Catalana de Nefrologia. No és de compliment obligat ni substitueix el judici clínic del personal sanitari.

Què són els antiinflamatoris no esteroïdals (AINE)?

Els antiinflamatoris no esteroïdals (tipus aspirina, ibuprofèn o naproxèn) són medicaments que redueixen els símptomes de la inflamació, el dolor i la febre. Actualment són uns dels fàrmacs més utilitzats i poden produir efectes secundaris en pacients amb malalties del cor, renals o del fetge.



Els antiinflamatoris tipus aspirina o ibuprofèn i les malalties del cor, renals o del fetge

Per què els pacients amb malalties de cor, renals o del fetge no han de prendre de manera rutinària antiinflamatoris no esteroïdals?

- Els resultats dels estudis mostren que aquests tipus d'antiinflamatoris poden afavorir la descompensació de la insuficiència cardíaca.
- Cal evitar-ne l'ús o extremar la precaució pel risc de pèrdua sobtada de la funció renal en pacients fràgils, amb edat avançada, que prenen més de 5 medicaments, i que a més prenen medicaments per al cor i per a la hipertensió arterial.
- Els antiinflamatoris no esteroïdals estan contraindicats en pacients amb malaltia del fetge greu. Amb els pacients amb malaltia de fetge lleu s'hauria de reduir la dosi i fer controls analítics.

-
- Per a la redacció d'aquesta recomanació s'ha comptat amb la participació i col·laboració del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
 - La recomanació completa es pot consultar a la pàgina web del **Projecte Essencial** <http://essencialsalut.gencat.cat>
 - Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se a 061 CatSalut Respon trucant per telèfon al 061, des de l'APP del 061 CatSalut Respon o enviant un correu electrònic a 061catsalutrespon@gencat.cat

Alguns drets reservats:

©2016 Generalitat de Catalunya. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObres Derivades 4.0 Internacional. La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>